

Aus dem Institut für gerichtliche und soziale Medizin
der Universität in Bonn.
(Direktor : Prof. Dr. Pietrusky)

Die Sturzgeburt in der gerichtlichen Medizin.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung

der

D o k t o r w ü r d e

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn.

Vorgelegt am 2. Nov. 1936

von

HELLMUTH LEHNHARDT

aus Duisburg

*

BONN 1937

Buchdruckerei Kubens Nachf., Inh.: H. Schnitzler, Maxstr, 75

Gedruckt mit Genehmigung
der med. Fakultät der Universität Bonn.
Referent: Reg. Med.-Rat Dozent Dr. Esser
Korreferent: Prof. Dr. Pietrusky



Unter Sturzgeburten im Sinne der gerichtlichen Medizin verstehen wir alle jene Fälle, bei denen aus den verschiedensten Gründen eine Schwangere von der Geburt überrascht wird, so daß das Kind, während sie sitzt, kniet oder steht aus ihren Genitalien herausstürzt.

Entweder verläuft die Geburt in der gewöhnlichen Weise und nur die Austreibungsperiode geht so schnell vorüber, daß die Schwangere durch den Austritt des Kindes überrascht wird, oder die ganze Geburt geht überstürzt vor sich. Für die überstürzt verlaufende Geburt, den *partus praecipitatus* der Geburtshelfer, ist die Definition, die v. Winkel anführt, die gebräuchlichste. Er versteht unter dem *partus praecipitatus* solche Geburten, „bei denen die Kreißenden in ungewöhnlicher Lage und Haltung außerhalb des Bettes von dem Austritt des Kindes überrascht und daher während der ersten und zweiten Geburtsperiode garnicht oder nur deshalb, weil Kunsthilfe noch notwendig war, ausnahmsweise innerlich von einem Sachverständigen exploriert worden sind“. In neueren Veröffentlichungen ist dieser Begriff dahin erweitert worden, daß auch solche Geburten den praecipitierten zugerechnet werden, die im Bett in so überstürzter Weise erfolgen, daß keinerlei Hilfe von einer geburtshilflich geschulten Person geleistet werden kann.

Bei den Sturzgeburten sind die Fälle häufiger, in denen nicht die Dauer der ganzen Geburt eine so kurze war, sondern nur die Austreibungsperiode schneller verlief, als jene, in denen die ganze Geburt so plötzlich verläuft, daß das Kind ohne deutlichen Vorboden aus den Geburtswegen fällt. Es sind dies die Fälle, in denen die Kreißende wohl Anzeichen der beginnenden Geburt bemerkt, die aber von ihr falsch gedeutet werden, so daß sie von der Austreibung des Kindes überrascht wird. In anderen Fällen hat sie wohl das Bewußtsein, daß die Geburt begonnen hat, nur der letzte Akt, die Austreibung des Kindes folgt überraschend. Bei heimlich Gebärenden und solchen, die die Schwangerschaft verborgen hielten, findet man, daß der richtige Zeitpunkt sich zurückzuziehen versäumt wird und die Schwangeren von der Ausstoßung des Kindes überrascht werden. Solche Fälle und besonders die, in denen Kreißende in verbrecherischer Absicht Sturzgeburten herbeiführen, sind vornehmlich Gegenstand der Untersuchung in der gerichtlichen Medizin.

Die erste größere Arbeit über Sturzgeburten stammt von Klein, der die „Württembergische Regierung“ im Jahre 1813 aufforderte, sich Klarheit über Sturzgeburten zu verschaffen. Bei allen Medizinalpersonen im ganzen Lande wurde angefragt, ob bei ihnen Fälle von Geburten im Stehen oder Sitzen vorgekommen seien. Auf diese Anfrage hin wurde über 183 Fälle erwiesener Sturzgeburt bei unverdächtigen Personen berichtet. 155 hatten stehend, 22 sitzend und 6 knieend geboren. Cohen van Baren berichtet über 100, Schütz über 50 Fälle von heimlicher Geburt. Trotzdem leugnete Hohl noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Möglichkeit eines Niederkommens im Stehen. Nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen kann kein Zweifel über das tatsächliche Vorkommen solchen abnormen Geburtsverlaufes bestehen.

Die Wehentätigkeit kann bei Sturzgeburten sehr verschieden sein. Entweder können die Wehen so stark sein, daß das Kind aus den Geburtswegen herausgeschleudert wird, oder sie sind von gewöhnlicher Stärke und das Kind fällt durch sein Eigengewicht zu Boden, während die Kreißende sitzt, kniet oder steht. Ferner können nach v. Winkel die Wehen vor dem Blasensprung im ganzen gering sein, die Fruchtblase aber so tief herabgetreten sein, so daß durch die Ausdehnung der vagina die gehende oder stehende Kreißende zum Mitpressen gezwungen wird, und dadurch das Kind beim Sprung der Blase mit dem Abgang des Fruchtwassers durch den vorbereiteten Weg unter kräftiger Anwendung der Bauchmuskulatur zu Boden stürzt. Bei einer anderen Gruppe werden die Wehen überhaupt nicht verspürt oder nur so schwach, daß sie für Vorwehen gehalten werden, oder, was besonders bei Erstgebärenden vorkommt, als Harn- oder Stuhldrang gedeutet.

Die Geburtsdauer kann eine normale sein, braucht es aber nicht. So fand z. B. v. Winkel unter 260 Sturzgeburten 52,6% mit ungewöhnlich kurzem, 39,5% mit normalem und 7,9% mit ungewöhnlich langem Geburtsverlauf. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Schwarzschild. Für die ungewöhnlich rasche Geburtsdauer fand Koch 74,3%, Moser 77,3% und Hellhake 60,6%. Für den ungewöhnlich kurzen Geburtsverlauf muß eine besondere Nachgiebigkeit und geringe Empfindlichkeit, für den ungewöhnlich langen eine allmähliche Erweiterung des Geburtskanals ange-

nommen werden. Es ist z. B. bekannt, daß bei gewissen rachitischen Becken die Geburtsdauer lange dauern kann, die Austreibung aber doch plötzlich infolge der Beckenausgangsweite eintreten kann, so daß eine Sturzgeburt entsteht.

Kommt eine Sturzgeburt in Frage, so sind die Befunde an der Mutter, die am Kinde, die von der Mutter und eventuell von Zeugen angegebenen Umstände des Falles zu erwägen, und letzten Endes ist der Ort der Geburt zu berücksichtigen.

Fast regelmäßig behaupten die Frauen, die wegen Kindestötung angeklagt sind, sie hätten die Geburt verkannt, es wäre ihnen nicht bewußt geworden, daß sie entbinden, oder sie hätten Stuhl- oder Harndrang gefühlt und deshalb einen Abort aufgesucht. Wiederholt begegnet man solchen Behauptungen bei Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlicht oder wenigstens in Abrede gestellt haben. Früher stand im preußischen Strafgesetz eine Bestimmung, daß jenseits der 30. Woche die Angabe des Verkennens der Schwangerschaft keine Geltung haben solle. Oft hört man von den des Kindesmordes Angeklagten, sie hätten die Schwangerschaft nicht erkannt, oder deshalb nicht daran geglaubt, weil sich die Menstruation noch gezeigt habe. Wald berichtet über einen Fall, der ein seit Jahren leidendes Mädchen betraf, in dem ärztlicherseits die Gravidität für Ascites gehalten und die Wehen als Koliken gedeutet wurden. Das Mädchen wurde schließlich stehend von der Geburt überrascht. Gering macht folgende Mitteilung: Eine Prostituierte gebar unerwartet über einen Nachttopf sitzend. Bemerkenswert ist dabei, daß sie wöchentlich zweimal von einem Arzt untersucht wurde, ohne daß er die Schwangerschaft erkannte.

Ein Verkennen der Schwangerschaft ist also wohl möglich und bewiesen, ganz abgesehen von jenen, wo der Coitus an Bewußtlosen, Geisteschwachen und Geisteskranken vollzogen wurde, oder bei sehr jugendlichen Mädchen, zumal wenn die Menstruation schon vorher unregelmäßig war.

Es ist begreiflich, wenn Erstgebärende angeben, sie seien von der Geburt überrascht worden, weil sie die Schmerzen nicht als Wehen erkannt haben. Der Druck des Kindeskopfes auf Blase und Darm bewirkt Harn- und Stuhldrang. So ist es verständlich, besonders aber wenn sie noch heimlich entbinden wollten, ja sogar bei Mehrgebärenden, daß sie zum Stuhldrang den Abort aufsuchten.

W i t t h a u e r teilt folgendes mit: Er wurde zu einer Schwangeren gerufen, weil die Geburt zu beginnen scheine. Er fand sie auf dem Nachstuhl. Sie erzählte ihm, sie habe eine große Portion Brustpulver genommen, welches starken Erfolg gehabt habe; sie habe die Empfindung, als ginge die Geburt vor sich. W. ließ die Frau ins Bett bringen und fand eine abgerissene Nabelschnur. Das Kind fand er im Nachstuhl ertrunken vor. Die Mutter hatte nur das Gefühl einer reichlichen Entleerung gehabt.

Wir hatten folgenden Fall zu begutachten:

Die des Kindesmordes Angeklagte gibt an: Sie habe plötzlich in der Nacht Leibschmerzen bekommen und ging auf den Eimer, um ihre Notdurft zu verrichten, wo sie nach kurzer Zeit etwas plumpsen gehört haben will. Daß dieses Plumpsen in den Eimer ein von ihr geborenes Kind gewesen sein soll, will sie nicht gewußt haben. Als sie aufstehen wollte, blieb sie an etwas hängen. Um sich davon zu befreien, rutschte sie mit dem Eimer an das Küchenbüfett heran und ergriff eine Nagelschere die dort lag. Sie schnitt etwas schnurähnliches ab und ging zu Bett. Im Eimer soll sich vor der Geburt in einer Höhe von etwa 10 cm Wasser befunden haben. Das Kind ließ sie im Eimer, wo es ungefähr eine halbe Stunde später gefunden wurde. Der hinzugezogene Arzt stellte den Tod des Neugeborenen fest.

Die 48 cm lange Leiche wiegt 2500 g. Das Ende des 32 cm langen Nabelschnurrestes ist ziemlich glatt. Lungen und Magen schwimmen im Wasser; ebenso etwa 50 cm vom Dünndarm. Schädelknochen, Gehirn, Sichel und Zelt sind unverletzt. Die mikroskopische Untersuchung der Lungen ergibt mit Sicherheit, daß Fruchtwasser bis in die Lungenbläschen gedrungen ist.

Nach alledem ist anzunehmen, daß der Tod des Kindes nach Sturzgeburt durch Ertrinken im Eimer herbeigeführt worden ist.

Erstgebärenden, denen jede Erfahrung fehlt, wird eine Verkenennung der Geburt eher als Mehrgebärenden zuzugeben sein; wenn auch ein solches Verkennen ein überaus seltenes Ereignis ist, so ist es selbst bei Pluriparae nicht unmöglich.

Die Angaben über die Häufigkeit der Sturzgeburten in bezug auf die Gesamtzahl der Geburten schwanken zwischen 0,58% und 2,8%. So hat nach den Statistiken B a y e r 0,58%, B i d d e r und

Sutugin 1,0%, v. Winkel 1,7%, Schwarzfild 2,27%, und Henning 2,8%.

Was die Mutter anbetrifft, so sind es Erst- und Mehrgebärende, bei denen die Sturzgeburt erfolgt.

v. Winkel gibt mehr- und vielfache Geburt als ein begünstigendes Moment für die Sturzgeburt an und zwar wegen der überhaupt kürzeren Geburtsdauer Mehrgebärender und der größeren Nachgiebigkeit der mütterlichen Weichteile. Er fand unter den Sturzgeburten 28,7% Erstgebärende, Koch 29,7%, Moser 36,4%. Fast übereinstimmend sind die Ergebnisse aller Autoren, und die Schwankungen bleiben in engen Grenzen. Wenn man die mechanischen Verhältnisse berücksichtigt, ist es auch verständlich, daß Pluriparae mehr beteiligt sind. Hierzu kommt noch nach Winkel, daß Mehrgebärende meist so lange als möglich mit der Aufnahme in die Klinik warten, um ihren Haushalt besorgen zu können. Andere hingegen, wie Hofmann und Fritsch geben an, daß Erstgebärende häufiger als Mehrgebärende von Sturzgeburten getroffen werden. Allerdings handelt es sich in gerichtlichen Fällen meist um Erstgebärende. Daß die Gerichtsärzte lehren, Fälle von Sturzgeburten betreffen meist Erstgebärende, hat seinen Grund darin, daß es sich in gerichtlichen Fällen vielfach um 1-parae, dazu meist noch außerehelich Gebärende, handelt. Unter diesen unehelich geschwängerten befinden sich jedenfalls mehr solche, die heimlich niederkommen wollen, die mit den Geburtsvorgängen wenig vertraut sind, die die Wehen als solche nicht erkennen und in ihrer Unerfahrenheit zu spät Hilfe suchen. Vielfach arbeiten sie so lange, bis sie an dem Ort, wo sie sich gerade befinden, von der Sturzgeburt überrascht werden.

Hauptsächlich führt das Verkennen der Preßwehen zu Sturzgeburten. Selbst Zweit- und Mehrgebärende verkennen oft diese Wehen und suchen arglos den Abort auf. Oft sind sie der Meinung, die Entbindung werde diesmal genau so lange dauern wie die erste und erfahren erst nachträglich von der erfolgten Geburt. Es gibt in der Literatur eine große Zahl ganz unverdächtiger Fälle.

In einer Mitteilung von Kunze handelt es sich um eine 2. para. Obwohl sie tagsüber Schmerzen verspürte, arbeitete sie. Am Abend traten in der Küche wiederum starke Schmerzen auf und unter Abgang von Fruchtwasser fiel ein Gegenstand aus ihren Genitalien heraus.

In einer Beobachtung von C o r i n gebar eine 3.-para in einen Leibstuhl hinein, nach einer unmittelbaren Unterfuchung durch C o r i n. Ähnliche Sturzgeburten fahen H e r z o g und L a u g i e r. Fälle diefer Art können beliebig vermehrt werden.

Wenn schon Pluripare die Wehen verkennen, fo ift es verftändlich, daß befonders Erstgebärende die ihnen unbekannten Wehen mit Stuhl- und Harndrang verwechfeln und deshalb einen Abort auffuchen. Daraus erklärt es fich wohl zum Teil, daß bei heimlich Gebärenden, die, wie erwähnt, meift 1-p. find, die Geburten fo häufig im Abort, oder auf dem Wege zu ihm, erfolgen. Allerdings ift damit nicht gefagt, daß nicht manche Gebärende in voller Kenntnis der Sachlage abfichtlich den Abort als Ort der Niederkunft auffucht, einfach deshalb, weil fie dort verborgen bleiben kann und eine Überraschung nicht zu fürchten hat. Es wird kaum möglich fein, diefe Abficht im konkreten Fall aus ärztlichen Erwägungen nachzuweisen.

Die Hausangestellte F. P. hat ein Mädchen heimlich geboren und das Kind in den Wafferkafen des Klofetts verfteckt. Sie hatte am fraglichen Tage morgens Leibfchmerzen, die nicht erheblich waren. Daß es fich um Wehen handelte, wußte fie angeblich nicht. Sie nahm an, fie müßte auf ein Klofett gehen. Das tat fie und hatte dort auch Stuhlgang. Als fie aufftand fiel das Kind heraus und auf die Erde. Die Nabelfchnur, die noch daran war, durchfchnitt fie mit einer Schere. Weil fich das Kind nicht rührte, glaubte fie, es wäre tot. In ihrer Angft fteckte fie es in den Wafferkafen.

Die Leiche des 3080 g fchweren Kindes ift 50 cm lang. Von der Nabelfchnur ift ein 20 cm langes Stück vorhanden, deffen freies Ende unregelmäßig, wie geriffen ausfieht. Lungen und Magen fwimmen im Waffer. Die Obduktion und mikroskopifche Unterfuchung ergeben, daß das Kind geatmet und gelebt hat und durch Ertrinken zu Tode gekommen ift.

Nachweisen kann man der Befchuldigten nicht, daß fie abfichtlich den Abort auffuchte, um dort zu gebären. Wohl aber fagt fie bei einer fpäteren gerichtlichen Vernehmung, fie wußte, als fie auf das Klofett ging, daß das Kind nun kommen follte.

Daß andererseits Abortgeburten häufig ohne böfe Abficht der Mutter gefchehen, ift wohl anzunehmen. Dadurch, daß die Schwan-

geren in der Meinung Stuhlgang zu haben den Abort auffuchen, droht den Kindern die Gefahr, in das Klosett hineingeboren zu werden und in der Spülflüssigkeit oder in den Fäkalien zu ertrinken. Derartige Fälle werden von Zeit zu Zeit beschrieben und geben dem Gerichtsarzt die Veranlassung, die Frage zu klären, ob es sich um Kindesmord oder fahrlässige Tötung handelt.

Die Kindesmutter G. sagt aus, sie sei beim Einkaufen schwindlig geworden. Nachts empfand sie im Unterleib einen schneidenden Schmerz. Es waren aber keine Wehen. Sie dachte, sie müsse ein Bedürfnis verrichten, wollte aber nachts nicht auf das Klosett gehen, sondern dies auf dem Eimer tun. Nach ihrer Rechnung konnte das Kind erst 1—2 Monate später kommen. Als der Schmerz immer schlimmer wurde, hat sie ihrem Ehemann davon Mitteilung gemacht, der sich anzog, um auf alle Fälle eine Hebamme zu rufen. Nachdem ihr Mann das Zimmer verlassen hatte, setzte sie sich auf den leeren Eimer. Kurz darauf, nachdem etwas Kot abgegangen war, gingen Kind und Nachgeburt sofort ab und fielen in den Eimer. Den Abgang des Fruchtwassers hat sie nicht gemerkt, auch hat sie keine Lebenszeichen an dem Kinde wahrgenommen. Wie sie in ihr Bett gekommen ist, und wie die Nabelschnur gerissen ist, vermag sie nicht zu sagen. Sie fühlte sich zu elend, um sich um das Kind zu kümmern.

Sie hat stets sehr leichte Entbindungen gehabt. Ihr zweites Kind war auch schon geboren, bevor die Hebamme kam.

Die Hebamme bekundet folgendes: sie sei sofort zu der Frau gegangen. Das Kind lag im Eimer. Hier fand sich auch Kot, Fruchtwasser und die Nachgeburt. Der Kopf des Kindes war nach unten in den Eimer gefallen. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.

Auf Grund der Obduktion und der mikroskopischen Untersuchungen von Lungen und Magen, läßt sich ein Leben des Kindes nicht feststellen. Damit ist aber nicht gesagt, daß das Kind mit Sicherheit tot geboren ist. Wenn es, wie im vorliegenden Falle mit dem Gesicht in Fäkalien oder auch auf den sofort mit ausgestoßenen Mutterkuchen fällt, so kann ein Atmen, daß sich vielleicht auch erst kurze Zeit nach der Geburt einstellt, nicht gelingen.

Die Möglichkeit, vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß durch geeignete sofortige Maßnahmen das Kind hätte

zum Atmen gebracht werden können. Als die Hebamme solche Wiederbelebungsversuche anstellte, war es natürlich zu spät.

Auffallend ist jedoch, daß eine Frau, die schon zwei Kinder geboren hat, sich über die Schmerzen vor der Geburt nicht klar war, und sie, deren erste Geburten sehr schnell verliefen, sich auf den Eimer begab und glaubte ein Bedürfnis zu verrichten.

Hier waren wieder die beiden Momente zusammen, die häufig von den des Kindesmordes Angeklagten als Entschuldigung angeführt werden: Verkennung des Stuhldranges und damit Sturzgeburt und später Erschöpfung.

Im allgemeinen soll man einer geistig gesunden Frau die Kenntnis von den Folgen eines Coitus zutrauen. Mindestens kann man jedoch verlangen, daß sie sich um das geborene Kind kümmert.

Trotz aller Unkenntnis ist die Mutter doch wegen Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen worden.

In der Berliner Charité ereignete es sich, daß eine Kreißende des nachts aus dem Bette sprang, sich auf einen in der Ecke stehenden Eimer setzte und das Kind unter heftigem Pressen in das gefüllte Gefäß gebar. Es gelang das Kind zu retten.

Westphal beschreibt eine Entbindung auf und aus einem Water-Klosett, bei einer Geisteskranken, die mit einem im Becken des Klosetts sichtbaren Kinde durch die Nabelschnur verbunden war.

Brouardel ist der Ansicht, daß bei gewöhnlicher Stellung eine unabsichtliche Abortgeburt nicht zutrifft, weil das Kind gegen die Brille geboren wird und wahrscheinlich zu Boden fallen wird. Nach Stumpf ist diese Ansicht irrig, weil bei den für Stuhlgang gehaltenen Wehen der Körper unwillkürlich nach vorn gebeugt wird, und das Kind daher doch in das Klosett geboren wird. Überdies beweisen einwandfreie Fälle ganz eindeutig, daß Abortgeburten vorkommen.

Rayner und Stuart berichten über eine Klosettgeburt, bei der der Kopf des Kindes durch die Klosettöffnung durchgetreten war und die Mutter offenbar unmittelbar im Anschluß an die Geburt an Schock starb. Bei der Mutter fanden sich Weichteilverletzungen. Von Wichtigkeit ist außer dem Tod der Mutter im Anschluß an die Sturzgeburt, daß der Kopf nur schwer aus der Ab-

eröffnung entfernt werden konnte, sodaß, wenn die Mutter nicht gestorben wäre, die Annahme naheliegend gewesen wäre, daß das Kind mit Gewalt hindurchgetrieben worden sei.

K o r n f e l d berichtet über eine Abortgeburt, bei welcher das Kind entweder durch Aspiration von Fäkalien erstickte oder durch die Kälte zugrunde gegangen war.

S c h n i t z e r beschreibt eine Sturzgeburt im Akte vermeinter Stuhlentleerung.

S p o r l e d e r teilt einen Fall mit, in der die Patientin auf dem Wege zur Klinik war. Unterwegs sei sie auf einen Abort gegangen um zu urinieren und sei dabei plötzlich durch Sturzgeburt entbunden worden. Das Kind sei in den Kofettrichter gefallen.

Es sei an dieser Stelle noch der vollständigen Schmerzlosigkeit der Geburt, des partus insensibilis, erwähnt, die ebenfalls zu Sturzgeburten führen kann. Sie ist bei gefunden Frauen überaus selten. Sie besteht nach F r i t s c h darin, daß bei einer Mehrgebärenden, die 6—8 Wochen nach der Geburt konzipiert, bevor vielleicht die Menstruation wieder vorhanden war, die nächste Geburt auffallend leicht verläuft. Oft wiederholt sich der partus insensibilis bei ein und derselben Frau. So berichtet I r v i n g über sechs völlig schmerzlos verlaufende Geburten bei einer Frau, deren Schwester ebenfalls schmerzlos entbunden haben soll. Ebenfalls beobachtete B. W o l f einen Fall von absoluter Schmerzlosigkeit der Wehen bei einer sonst gefunden Frau. Die Tätigkeit der Bauchpresse fehlte dabei vollständig. So entstehen bisweilen Sturzgeburten in den Abort hinein, ohne daß sich die Mutter des Vorganges rechtzeitig bewußt wird. Daß unter pathologischen Verhältnissen ein partus insensibilis eintreten kann, ist bekannt. Es handelt sich um Frauen, die an Tabes dorsalis leiden, bei denen die schmerzleitenden Bahnen im Rückenmark zerstört sind. Solche Fälle haben C o h n, M i r a b e a u und P l a c z e k mitgeteilt.

Über die Möglichkeit einer Ohnmacht bei einer Sturzgeburt ist viel gestritten worden. Vielfach wird von den Müttern der Einwand erhoben, sie seien während oder nach Beendigung der Geburt von einer Ohnmacht überrascht worden. S t r a ß m a n n hat mehrfach betont, daß der Skeptizismus ärztlicher Sachverständiger gegenüber den Angaben der Mütter bzgl. Sturzgeburt und Ohnmacht

nicht berechtigt erscheine. Zugegeben und betont wird die Ohnmacht von D ö r f l e r, B a y e r, S c h w a r z s c h i l d und besonders von F r e y e r. F r e y e r führt in seiner Arbeit drei unantastbare Beispiele einer Ohnmacht während der Geburt an. In 5 Fällen waren die Angeklagten während des Gebäraaktes von Zeugen im Zustand einer Ohnmacht angetroffen worden.

H a b e r d a konnte von 11 Müttern, die eine Ohnmacht behaupteten, einen Fall sicherstellen.

K o r n f e l d berichtet über einen Kindessturz in einen Eimer, bei dem die Gebärende in Ohnmacht fiel.

D e f r a n c e s c h i über eine Sturzgeburt im Freien, mit anschließender Ohnmacht.

S c h w a b e über ein Sturzgeburt auf dem Abort, den die Schwangere zum Stuhlgang auffuchte. Sie wurde ohnmächtig.

Aufrechte Körperhaltung, großer Schmerz, heftige Gemütbewegung, plötzliche Entleerung der Gebärmutter und starke Blutung begünstigen nach S t r a ß m a n n und F r e y e r das Eintreten einer Ohnmacht. Wenn auch eine Ohnmacht nach Sturzgeburt im allgemeinen äußerst selten ist, so kann man doch nicht eine solche Angabe einer Angeklagten ohne weiteres als Lüge bezeichnen. Vielmehr wird man nachzuforschen haben, ob das eine oder das andere begünstigende Moment vorlag, und ob das ganze Verhalten der Angeklagten vor, während und nach der Geburt die Ohnmacht wahrscheinlich erscheinen läßt. Jedenfalls ist die Sturzgeburt ein Moment, das Ohnmacht bewirken kann.

In gerichtlichen Fällen stoßen wir oft auf die Angaben heimlich Entbundener, sie hätten sich nach der Geburt in einem Zustand derartiger körperlicher Schwäche oder seelischer Verwirrung befunden, daß sie sich nicht um ihr Kind hätten kümmern können. Auch hier muß die Möglichkeit zugegeben werden, daß die gleichen Momente, welche eine Ohnmacht bewirken, Erschöpfung und Schwäche herbeiführen können.

In einem Garten wurde die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden, das in einen Schuhkarton eingepackt war. Als Kindesmutter wurde die Haushälterin F. B. ermittelt. Sie hatte sich gegen 21 Uhr zu Bett begeben und wurde nach etwa einer Stunde durch heftige Schmerzen wieder wach. Durch Hockstellung hatte sie etwas Erleichterung der Schmerzen und ist deshalb auf einem Toiletten-

eimer sitzen geblieben. Hier hat sie dann geboren und das Kind ist dabei in den Eimer, auf dem sie saß, gefallen. Sie muß dann bewußtlos geworden sein. Als sie wieder zu sich kam, saß sie immer noch auf dem Eimer mit dem Kopf auf den Bettrand gestützt. Ob das Kind gelebt hat, kann sie nicht sagen, denn sie hat es weder wimmern noch schreien gehört. Sie hat sich dann völlig ermattet ins Bett gelegt und sich nicht weiter um das Kind gekümmert. Zwei Tage lang ließ sie es im Eimer liegen, dann packte sie es in einen Schuhkarton und warf es über einen Zaun in ein Gartengrundstück. Eine Tötung bestreitet sie und gibt nur zu, daß sie sich nach der Geburt um das Kind nicht gekümmert habe, weil sie infolge der Geburt benommen und bewußtlos war.

Am Nabel der Leiche des 48 cm langen und 2200 g schweren Kindes befindet sich eine 60 cm lange Nabelschnur, an der noch die Nachgeburt hängt. Es sind starke Verwesungszeichen vorhanden. Eine reichliche Menge Maden bedecken den ganzen Körper. Der Schädelumfang mißt 30,5 cm. Die Schäeldurchmesser betragen 8:10:12 cm. Die Schulterbreite mißt 8,5 cm, die Hüftbreite beträgt 6 cm.

Der Magen ist durch eine große Gasblase ausgedehnt. Die Darmschlingen sind zusammengefunken und enthalten keine sichtbare Gasfüllung. Sie sinken im Wasser unter. Beide Lungen schwimmen im Wasser.

Unter der Knochenhaut des rechten Scheitelbeins findet sich im vorderen Drittel 2 cm von der Pfeilnaht entfernt, eine pfennigstückgroße Blutung. Bei ihrer Entfernung tritt darunter ein zackiger 1 cm langer Knochensprung hervor, der etwa 1½ cm seitlich vom Rande des Scheitelbeins beginnt und annähernd parallel der rechten Kranznahthälfte verläuft.

Wie durch die Leichenöffnung festgestellt wurde, handelt es sich um ein annähernd reifes und lebensfähiges Neugeborenes. Es waren Zeichen von Atmung vorhanden. Die ganze Beurteilung war durch die weit fortgeschrittene Leichenzerfetzung und vor allem durch umfangreichen Madenfraß erschwert. Das Hauptgewicht fiel daher der mikroskopischen Untersuchung zu. Bei dieser Untersuchung fand sich nun in den verschiedenen Lungenteilen eine außerordentlich reiche Ansammlung von Fruchtwasserbestandteilen, wodurch ein Erstickungstod des Kindes klargestellt war. Es erhebt sich die Frage, wie diese Todesursache in ihrem Entstehungsmechanismus

zu erklären ist. Einmal können Fruchtwasserbestandteile, wie sie in diesem Falle gefunden wurden, beim Durchtritt des kindlichen Kopfes durch die mütterlichen Geburtswege im Verlauf des Geburtsvorganges in Rachen und Luftröhre hineingelangen und dann mit den ersten kindlichen Atemzügen in die Lungen eingeatmet werden. Ferner können Fruchtwasserbestandteile auch nach Beendigung des eigentlichen Geburtsvorganges in die kindlichen Luftwege gelangen, wenn die Geburt in ein Gefäß (Eimer, Nachtgeschirr) hinein erfolgte, wofelbst sich das während des Geburtsverlaufes abgeflossene Fruchtwasser angesammelt hat. Kommt das Kind mit dem Gesicht in diese Massen zu liegen, so wird je nach der Höhe des Flüssigkeitsspiegels mehr oder weniger davon eingeatmet und eine Erstickung ist dann auch gegeben. Charakteristische Fremdbestandteile wie Pflanzen- oder Muskelfasern und Wurmeier wurden weder in den Lungen noch im Magen oder Darm gefunden. Vergleicht man das Untersuchungsergebnis mit den Angaben der Kindesmutter, so ist folgendes zu sagen: Wenn man ihre Behauptung, daß sie bei der Geburt des Kindes über dem Eimer von einem Schwächezustand befallen wurde, als richtig unterstellt, so könnte in dieser Zeit, wo sie sich nicht um das Kind kümmern konnte, dessen Tod durch Erstickung in dem Fruchtwasserinhalt des Eimers erfolgt sein. Ob die Aufnahme der Erstickungsmassen bereits beim Durchtreten des Kindes durch den Geburtskanal oder erst außerhalb erfolgte, läßt sich in Anbetracht der Fäulnis und des Madenfraßes nicht sicher entscheiden. Die Verletzung des rechten Scheitelbeins kann beim Geburtsverlauf in den Gebärwegen geschehen sein. Es kommt hierbei bisweilen zu Verschiebungen der Schädelknochen, wobei Knochensprünge auftreten können. Zum anderen kann man bei dieser Verletzung an die Folgen einer Sturzgeburt in den Eimer oder auf dessen Rand denken, was aber weniger wahrscheinlich erscheint.

Was die psychische Verfassung der Gebärenden anbelangt, so sagt D ö r f l e r darüber folgendes: Der Geisteszustand Gebärender ist physiologisch aufs ungünstigste beeinflusst durch die vorausgehenden Veränderungen der Psyche in der Schwangerschaft. Die Gemütsaufregungen zu Anfang der Geburt, das Gefühl der Hilflosigkeit, die Steigerung des Blutdruckes im Gehirn während der Austreibungsperiode, die Ohnmachtsanwandlungen zu Ende der Geburt, alle diese Momente können einen schädlichen Einfluß auf den Gei-

fteszustand ausüben. Der Geisteszustand der Gebärenden stellt deshalb zu jeder Zeit einen mehr oder weniger hochgradigen Erregungszustand des Gehirns mit feiner psychischen Tätigkeit dar. Die Zurechnungsfähigkeit ist jedoch meist erhalten, doch sind die geringsten Begünstigungsmomente, wie neuropathische Belastung, abnorm schmerzhaftes Wehen, abnorme Widerstände, heimliche Geburt, vorausgegangene Gemütsdepressionen besonders bei unehelich Gebärenden imstande, das Gleichgewicht des Geisteszustandes zu stören.

Eine Anzahl dieser Momente sind gerade bei Sturzgeburten vorhanden. Immerhin stimmen alle Autoren darüber überein, daß solche Fälle ungemein selten sind.

Ist die Mutter sich bewußt, daß durch Unterlassung des von ihr für den Fortbestand des Lebens als notwendig erkannten Beistandes der Tod des Kindes eintritt und unterläßt sie trotzdem diesen Beistand, so macht sie sich des Verbrechens der vorsätzlichen Tötung des neugeborenen Kindes schuldig. Der § 217 des Strafgesetzbuches lautet: „Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich nach der Geburt vorsätzlich tötet, wird mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter 2 Jahren ein.“

Die Gesetzgebung behandelt also den Kindesmord durch unehelich Gebärende besonders milde. Diese Milde entspringt der Anerkennung der geminderten Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten.

In der Wohnung der F. K. wird die Leiche eines Kindes weiblichen Geschlechts in Papier eingewickelt und verschnürt gefunden.

Die Frau erklärte, daß sie das Gefühl hatte, kurz vor ihrer Niederkunft zu stehen. Sie beabsichtigte ins Krankenhaus zu gehen und sich vordem umzuziehen. Hier aber erfolgte die Geburt. Sie setzte sich auf den Eimer, in dem sich etwas Wasser befand und blieb so lange sitzen, bis die Nachgeburt abgegangen war. Das kann ungefähr eine halbe Stunde gedauert haben. Sodann legte sie sich in etwas erschöpftem Zustand ins Bett und dachte nicht weiter darüber nach, nach dem Kinde zu sehen. Nachdem sie sich etwas erholt hatte, stand sie auf, trennte die Nachgeburt mittels einer Schere und wickelte das ihrer Meinung nach tote Kind in ein Tuch ein.

Die weibliche Kindesleiche wiegt 2500 g und ist 48 cm lang. Der Nabelschnurrest sieht am Ende wie scharf abgeschnitten aus,

und ist 4 cm lang. Die Lungen erscheinen stark gebläht. In Wasser gebracht schwimmen sie an der Oberfläche, ebenso die einzelnen Lappen und kleine abgeschnittene Teile. Der Magen und der Zwölffingerdarm sind prall mit Luft gefüllt. Beide Organe schwimmen im Wasser an der Oberfläche.

Der bei der Obduktion erhobene Befund in Verbindung mit dem Ergebnis der mikroskopischen Untersuchung läßt mit Sicherheit annehmen, daß das Kind geatmet und gelebt hat und daß es ertrunken ist. Die Dauer des Lebens wird man nach dem Luftgehalt des Darmes schätzen können, allerdings ist dabei große Vorsicht geboten. Man wird annehmen können, daß das Kind etwa eine halbe Stunde gelebt hat und dann ertrunken ist. Dieser Befund ist in Einklang mit den Angaben der Angeklagten zu bringen. Sie behauptet von der Geburt überrascht worden zu sein, das Kind plötzlich in einen Eimer, in dem sich etwas Wasser befunden hat, hineingeboren zu haben; dann sei sie eine halbe Stunde auf dem Eimer sitzen geblieben. Es ist denkbar, daß durch die Nachgeburt das Kind, das zunächst oberhalb der Wasserfläche gelegen hat, in das Wasser hineingebracht worden ist und jetzt hier ertrunken ist. Jedenfalls kann bei diesen Angaben der Angeeschuldigten gesagt werden, daß das Kind gerettet worden wäre, wenn die Frau es jetzt noch aus dem Eimer genommen hätte, als sie sich ins Bett begab.

Die Tötung des Neugeborenen durch Unterlassung des bei der Geburt nötigen Beistandes kann durch absichtliche Unterlassung der Unterbindung der Nabelschnur geschehen. Selbstverständlich liegt ein Verschulden der Mutter vor, wenn sie absichtlich zu ihrer Geburt einen Ort wählt, wo das aus den Geburtswegen fallende Kind zugrunde gehen muß, wie z. B. in mit Flüssigkeit gefülltem Eimer, oder in einen Abort. Gewiß, es kommt nicht selten in gerichtlichen Fällen vor, daß eine Gebärende absichtlich den Abort auffucht.

Für die Beurteilung einer Sturzgeburt sind die Befunde an der Mutter zu beachten.

Stets sind zum Zustandekommen einer Sturzgeburt geringe Widerstände seitens der mütterlichen Geburtswege und des Kindes Voraussetzung. Sind die mütterlichen Weichteile nachgiebig, dann kann der ganze Geburtsakt in überaus kurzer Zeit, bei Mehrgebärenden in einigen Minuten ablaufen. Man darf die Möglichkeit einer

Sturzgeburt selbst dann nicht ausschließen, wenn das Becken nicht besonders weit, das Kind gut entwickelt ist und sogar am Kopfe Spuren des erlittenen Druckes darbietet. Trotzdem kann die Mutter in Unkenntnis der letzten Wehen das Kind verlieren, und darauf allein kommt es an. Das kann bei rachitischen Becken mit relativ weitem Beckenausgang eintreten. Die Beckenmaße sind, soweit sie bei den einzelnen Autoren bei Sturzgeburten angegeben sind, nicht größer, als dem Mittel entspricht. Es kommt ihnen also keine wesentlicher Bedeutung zu.

Eine gewisse Bedeutung aber haben die Körpermaße eines Kindes, namentlich der Durchmesser des Kopfes und der Schultern. Daß Kleinheit der Frucht eine Sturzgefahr begünstigt, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Bei fast allen Autoren finden wir mehr als die Hälfte der Kinder, nämlich 55,7% bis 77,1% ein unter dem Mittel liegendes Gewicht. Es sei hier aber erwähnt, daß selbst Sturzgeburten bei Kindern festgestellt wurden, die 7—9 Pfund wogen. *Bonnemaison* berichtet sogar über einen Fall, wo das gleichzeitig mit der Nachgeburt geborene Kind 5 kg wog. Die bei dem Kinde festgestellten Maße gewinnen aber erst eine wirkliche Bedeutung, wenn man sie mit dem mütterlichen Becken vergleicht. Je größer die Beckenmaße und je kleiner der Durchmesser des Kopfes und der Schultern des Kindes, um so wahrscheinlicher erscheint die Möglichkeit einer Sturzgeburt.

Daß bei Zwillingsgeburten, bei denen doch meist kleinere Kinder geboren werden, so selten eine Sturzgeburt eintritt, erklärt *v. Winkler* einerseits damit, daß die Geburt des ersten Zwillings meist zögernd verläuft, andererseits, daß Zwillinge tragende Mütter infolge stärkerer Beschwerden meist rechtzeitig Hilfe suchen. Unter seinen 216 Sturzgeburten befindet sich kein Fall. *Reinhard* berichtet von einem Fall aus der Marburger Klinik; *Straßmann* von einer 22jährigen folgendes: Im Beginn des siebenten Schwangerschaftsmonats traten Wehen auf, die von abwechselnder Stärke waren. Sie ging von Hause weg zur Klinik. Unterwegs begann sie zu bluten, und sie rannte daher so schnell wie möglich zur Klinik. Wenige Schritte vor derselben wurde ihr nachgerufen, daß sie etwas verloren habe. Auf das Kreißzimmer gebracht, fand sich die innere Seite der Oberschenkel mit Meconium und Blut befudelt. Aus der Schamspalte hängt eine ca. ein Fuß lange, schräg durchrissene Nabel-

schnur heraus, daneben eine zweite, noch leise pulsierende Nabelschnurschlinge. Der zweite Zwilling wurde extrahiert.

Als unmittelbare Folgen, die Sturzgeburten nach sich ziehen können, werden zunächst Weichteilverletzungen in Frage kommen. Das sind in erster Linie Dammverletzungen, dann Scheiden- und Cervixrisse und ganz selten Verletzungen der Klitoris und der Labien. Ruppauer sah bei einer Erstgebärenden, die in hockender Stellung entbunden hatte, einen fast queren Riß an beiden inneren Labien und zwar bei unverletzten Bändchen und Damm, von dem rechts an der Innenseite der großen Labien ein Riß nach oben bis in den mons veneris zog, sodaß hier sogar das Unterhautfettgewebe bloßlag.

Dey fand einen Fall, bei dem die Gebärende aus einem Cervicalriß innerhalb weniger Minuten eine solche Menge Blut verlor, daß sie einen erheblichen Grad von Anaemie aufwies.

Was die Häufigkeit der Scheiden- und Dammrisse anbelangt, so sind die Angaben der einzelnen Autoren verschieden. Reinhard hatte unter 23 Sturzgeburten keine, Bidder u. Sutugin unter 20 und Goltz unter 37 je einen Dammriß. Hugenberger berechnet 6,9%, v. Winkel 27%, Koch 18,9%, Tscherniewsky 5,9%, v. Szabo 25,6% Moser 18,2%, Bayer 27% und Bonnemaïson 9%.

Bei einigen Autoren fällt die geringe Anzahl der Dammrisse auf. Diese müssen die kleinen außer acht gelassen haben. Bei normalen Geburten wird die Zahl der Dammrisse zwischen 15 und 20% berechnet. Der Anteil den die Mehrgebärenden bei den Dammrisßen stellen, ist bei Sturzgeburten bedeutend größer, wie bei den normalen Geburten. Schwarzschild fand 45% Dammrisse bei Pluriparis gegenüber dem sonstigen Mittel von 15%. Andere Autoren haben noch günstigere Ergebnisse für I.p. gefunden: Hellhake 63,3%, Winkler 54%, Héracourt 50%.

Schon hieraus geht hervor, daß die Ursache für Weichteilverletzungen bei Sturzgeburten nicht in der Rigidität derselben zu suchen ist. Das zeigt z. B. der von Knepper mitgeteilte Fall von einer 43jährigen Erstgebärenden, die, in der Meinung, Stuhlgang zu haben, rasch das Nachtgeschirr auf das Fußbänkchen stellte, um sich darauf niederzulassen, als plötzlich ein Kind von ungefähr 3000 g von ihr in das Geschirr hineinschoß. Die Weichteile der Frau wiesen

keine Verletzungen auf mit Ausnahme eines kaum merkbaren Einrisses am Frenulum.

v. W i n k e l erklärt die Entstehung der Dammrisse durch die ungünstige Stellung. Denn im Stehen und Gehen preßt die vermehrte Beckenneigung den Kopf stärker gegen den Damm, und beim Sitzen hemmen die zusammengedrückten Schenkel die gehörige Entfaltung der Weichteile. Daraus erklärt sich auch die Tatsache, daß W i n k l e r 54% und H é r a c o u r t sogar 50% aller Weichteilverletzungen bei I.p. fand.

Ein weiteres ätiologisches Moment für Dammrisse bei Sturzgeburten sieht man in der Größe des Kindes. M o s e r beschreibt einen Fall von einer 20jährigen I.p. Sie gebar auf dem Wege zur Anstalt einen Knaben von 44 cm Länge und einem Gewicht von nur 1600 g, wobei sogar ein Dammriß II. Grades entstand.

Schwarzchild, Winkler, Lipinski und Spörle dagegen fahen den größten Teil der Dammrisse bei Kindern über 3000 g.

Das Verhalten der Weichteile hat also für die Beantwortung der Frage, ob eine Sturzgeburt vorliegt oder nicht, keine besondere Bedeutung. Findet man aber einen Dammriß und schließt kein anderer Umstand eine Sturzgeburt aus, so kann man in gerichtlichen Fällen auf die Möglichkeit des raschen Durchtritts des Kindes durch die äußere Scham hindeuten.

Unter den weiteren Folgen nach Sturzgeburten für die Mütter sind besonders Blutungen zu nennen. Die Zerrung an der Nabelschnur kann eine teilweise Lösung und damit eine atonische Blutung hervorrufen. In gerichtlichen Fällen erfährt man meist nichts Genaueres über die Stärke der Blutung. In manchen Fällen, wo nur die Aussage der Mutter vorhanden ist, findet man Angaben über starke Nachgeburtsblutungen. Es fragt sich, ob diese Aussage nicht befunden ist, um eine Bewußtlosigkeit wahrscheinlich zu machen. Von geburtsbilllicher Seite dagegen hört man von einer größeren Stärke und Häufigkeit der Blutungen nach Sturzgeburten als sonst. Doch weder v. W i n k e l, K o c h, H e l l h a k e, B a y e r noch F r i t s c h haben einen Verblutungstod feststellen können; dagegen beobachtete B o n n e m a i s o n zwei.

Die Placenta geht nach Sturzgeburten oft durch den Zug an der Nabelschnur ab; bisweilen fällt sie nach einigen Schritten aus den Genitalien heraus, oder erst nach einiger Zeit.

Wichtiger als die Befunde an der Mutter sind zur Entscheidung der Frage, ob eine Sturzgeburt vorliegt oder nicht, die Befunde am Kinde.

Bei Sturzgeburten im Anschluß an einen schnellen Verlauf der ganzen Geburt wird man am Kind wohl kaum ein Kopfgeschwulst finden. Das Fehlen einer Kopfgeschwulst spricht zugunsten einer Sturzgeburt, doch muß sie deshalb nicht stattgefunden haben. Ein Vorhandensein dagegen beweist nur, daß das Kind in Kopflage geboren ist, was mitunter von großer Bedeutung sein kann. Da die Kopfgeschwulst im Verhältnis zur Geburtsdauer steht und nur bei längerem Druck zustande kommt, so kann man die so häufige Aussage der Mutter, sie habe von der herannahenden Geburt nichts bemerkt, oder sie sei von der Geburt überrascht worden, zurückweisen. Das Vorhandensein einer Kopfgeschwulst spricht jedoch nicht gegen die Möglichkeit einer Sturzgeburt, denn es kann die Geburt im ganzen langsam verlaufen sein und im letzten Augenblick das Kind doch aus den Geburtsteilen herausgefallen sein.

Es wird gegen die Hausangestellte A. B. am 4. 5. Anzeige wegen Verdacht der Kindestötung erstattet.

Sie gab bei ihrer Vernehmung an: Seit Januar habe sie gemerkt, daß sie schwanger sei, habe aber niemanden etwas davon gesagt. Am 28. 4. sei sie morgens in der Küche beschäftigt gewesen, als die Wehen eingetreten seien. Im Zimmer habe sie die Hose ausgezogen, um sich zu Bett zu legen. Sie habe sich aber nicht hinlegen können, da die Wehen wieder einsetzten. Während sie noch vor dem Bett stand, sei das Kind aus ihrem Leibe auf die Erde gefallen, dabei sei die Nabelschnur gerissen. Zwei Minuten später habe sie das Kind aufgehoben, aber es sei tot gewesen. Sie habe es dann gewaschen und in ein Tuch gewickelt. Bei der richterlichen Vernehmung fügt sie noch hinzu, daß sie nach der Geburt ohnmächtig zu Boden gefallen sei.

Die Kriminalpolizei fand die Kindesleiche in einem kleinen Schrank auf dem Zimmer der B. in eine Leinenschürze und Papier eingewickelt.

Die Kindesleiche ist 51 cm lang. Am Nabel findet sich ein stark vertrockneter Nabelfschnurest von 4,5 cm. Offenbar ist die Nabelfschnur abgerissen, doch läßt der Vertrocknungszustand eine sichere Entscheidung dieser Frage nicht zu. Querer Kopfdurchmesser 9 cm, gerader 19 cm. Kopfumfang 34 cm, Schulterbreite 11 cm, Hüftbreite 8 cm. Lungen, Magen und Duodenum schwimmen im Wasser. An der Innenseite der Kopfschwarte befindet sich im Bereich des Stirnbeins und beider Scheitelbeine eine deutliche Schwellung des Gewebes und eine Durchblutung. Der knöcherne Schädel ist unverletzt. Das Gewebe der harten Hirnhaut im Bereich der ganzen Hirnsichel ist von zahlreichen Blutaustritten durchsetzt.

Nach der Darstellung der Angeklagten kann man annehmen, daß eine Sturzgeburt vorgelegen hat. Erfahrungsgemäß kommt es bei Sturzgeburten sehr oft zu Zerreißung der Nabelfschnur. Wie die Leichenöffnung ergeben hat, ist die Nabelfschnur wenigstens mit größter Wahrscheinlichkeit gerissen. In der Kopfschwarte des Neugeborenen waren Kennzeichen einer deutlichen Geburtsgehwulst. Eine solche Gehwulst kommt zustande, wenn der kindliche Kopf längere Zeit an den Weichteilen und Knochen des Beckenausganges angepreßt war. Das spricht jedoch nicht gegen eine Sturzgeburt, da nur der letzte Akt der Geburt sehr schnell erfolgt sein kann, wobei das Kind zu Boden fiel.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Leichenöffnung keinerlei Befunde ergab, die der Aussage der Angeklagten, sie habe keine verbrecherischen Maßnahmen am Kinde vorgenommen, widersprechen. Der Obduktionsbefund und die mikroskopischen Untersuchungen sprechen für einen natürlichen Tod. Die Möglichkeit einer Sturzgeburt muß zugegeben werden.

Daß bei Sturzgeburten fast ausschließlich Schädellagen vorkommen ist verständlich, denn bei Beckenendlagen würde der nachfolgende Kopf, wenn auch nur für einen Augenblick, leicht stecken bleiben. v. Winkel fand unter 216 Fällen von Sturzgeburt 3 Beckenendlagen, Hellhake unter 47 zwei, Moser unter 22 und Héracourt unter 61 je eine Steißlage.

Haberda konnte in einem Fall von Geburt in Steißlage, wobei das Kind in eine Butte mit Schmutzwasser hineingeboren worden war, die Möglichkeit einer Sturzgeburt nicht ausschließen, zumal Lungen und Magen luftleer gefunden wurden.

Bei dem Herauschießen des Kindes aus den Geschlechtsteilen der Mutter und dessen Stürzen auf die Erde oder in einen Abort hinein kommen vor allen Dingen Verletzungen des Kopfes vor. Bei geringer Fallhöhe und weicher Unterlage wird man naturgemäß weniger Verletzungen erwarten können, als wenn das Kind von bedeutender Höhe auf einen harten Boden fällt. So sind die Verletzungen des Kindes sehr verschieden, von leichten Hautabschürfungen bis zu Schädelfrakturen. Häufig sind die Kleider, ebenso die Nabelschnur, wenn diese auch reißt, oder die Schenkel der Gebärenden ein besonders wichtiges Schutzmittel, indem durch sie die Wucht des Falles wesentlich abgeschwächt wird. Daß das Kind beim Herausstürzen aus den mütterlichen Geburtswegen tödliche Verletzungen am Kopfe erleiden kann, unterliegt heute keinem Zweifel mehr. Sie treten aber in den meisten Fällen nicht ein, weil der Schädel eines Neugeborenen schwere Insulte vertragen kann. Die einst von Klein vertretene Ansicht, daß ein Kindessturz aus den Genitalteilen der Frau nie zu Schädelfrakturen Veranlassung gebe, hat bisweilen immer noch Anhänger. Doch sind durch einwandfreie Fälle und durch entsprechende Versuche von Casper, Hofmann und Lesser an Leichen neugeborener Kinder solche Verletzungen erwiesen. In gerichtlichen Fällen handelt es sich häufig darum festzustellen, ob eine Schädelfraktur Folge eines Kindessturzes, oder einer gewalttätigen Verletzung ist.

Bemerkenswert dafür ist folgender Fall des Instituts:

Die des Kindesmordes angeklagte Mutter B. hat schon ein uneheliches Kind im Alter von $1\frac{1}{2}$ Jahren. Als sie gegen 2 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, sagte sie ihrer Mutter, die von ihrer neuen Schwangerschaft wußte, daß ihr Leib so weh tue und daß sie ein wenig fortgehen wolle. Gegen 19 Uhr kam sie zurück. In der mitgenommenen Tasche hatte sie in ihrer Schürze, in ihrer Hemdhose eingewickelt, ein neugeborenes Kind. Die Hebamme wurde gerufen, dann kam die Nachgeburt.

Die Beschuldigte selbst gibt an: Nach ihrer Berechnung mußte sie erst später niederkommen. Am fraglichen Tage hatte sie keine Wehen, wohl aber ein wenig Leibschmerzen. Sie hatte keine Bedenken in die Stadt zu gehen. Dort, in der Nähe eines Kinos kam, während sie ging, das Kind. Sie riß schnell ihre Hemdhose herunter und wickelte das Kind, das auf die Straße gefallen war, in diese ein.

Bei der Sektion wurden folgende Befunde erhoben: Die Leiche des 51 cm langen und 3100 g schweren Kindes ist die eines reifen. Es sind keine Verschmutzungen durch Erde am Körper oder Kopf festzustellen. Der Schädel ist stark deformiert. Das rechte Hinterhaupt, sowie die linke Hirn- und Schläfengegend sind stark abgeflacht. Über dem linken Hinterhaupt und der rechten Schläfengegend ist ein starker Bluterguß, ebenfalls über dem linken Scheitelbein und dem linken oberen Augenrand. Das rechte Scheitelbein ist der ganzen Länge nach durch einen senkrecht auf die Mitte hin zulaufenden Sprung durchsetzt. Das linke Scheitelbein ist von dem Punkte seiner höchsten Wölbung durch vier senkrecht zueinander stehende Sprünge, von denen der eine senkrecht zur Mittellinie steht, in vier annähernd gleich große Stücke zerbrochen. Hinten ist dieses Scheitelbein in geringer Ausdehnung gesplittert. Rechts am Hals ist eine bläulich-rote Verfärbung mit Bluterguß. Der Nabel ist kunstgerecht versorgt. Sein freies Ende sieht wie geschnitten aus. In der Mitte des Rückens ist eine etwa linien große blaurote Verfärbung mit deutlichem Bluterguß.

Das Kind ist infolge Schädelbruches verstorben. Dieser Schädelbruch soll durch eine Sturzgeburt auf der Straße entstanden sein. Ob wirklich eine solche Sturzgeburt vorgelegen hat, ist auf Grund der Obduktion nicht zu sagen. Das Vorhandensein einer Kopfgeschwulst spricht nicht gegen diese Annahme. Schädelbrüche kommen selten bei Fällen, wie er angeblich hier vorliegt, vor. Es handelt sich dann um kurze Sprünge in einem oder beiden Scheitelbeinen, seltener auch einmal um zwei Sprünge in einem dieser Knochen. Hier aber lag eine viel schwerere Verletzung vor. Der Schädel war stark deformiert. Daß eine so schwere Verletzung durch einen Fall aus den Geschlechtsteilen auf die Erde, selbst bei Steinpflaster, entstehen soll, wird man nicht annehmen können. Die Beschuldigte sagt, daß es sich um eine Sturzgeburt auf einer belebten Straße vor einem Kino am späten Nachmittag gehandelt hat. Sie will hier das Kind nicht nur geboren, sondern will sich auch die Hemdhose ausgezogen haben und das Neugeborene in diese eingewickelt haben. Ob eine Hemdhose unter den gegebenen Umständen so schnell auszuziehen ist, ohne daß Passanten auf diesen Vorgang, ganz abgesehen von der Geburt, aufmerksam geworden sind, erscheint recht zweifelhaft. Im übrigen war das Ausziehen nicht

notwendig, weil zur Unterbringung des Kindes eine Tasche und in dieser eine Schürze vorhanden war. Im allgemeinen pflegt ein solches Kleidungsstück um die Beine nicht so weit zu sein, daß nicht nur der Oberschenkel darin Platz hat, sondern auch noch ein ausgetragenes Kind beim Stehen mit gespreizten Beinen hindurchstürzen kann. Auf das Stürzen kommt es hier an, weil ein allmähliches Herausgleiten und Fallen auf die Erde Schädelbrüche nicht verursachen kann.

Bemerkenswert sind die Würge Spuren als Hals des Kindes, ferner Zeichen, wie wir sie bei gewalttätiger Erstickung sehen. Die Frau kann, als der Kopf des Kindes geboren war, das Neugeborene am Halse gefaßt und herausgezogen haben, um die Geburt schneller zu beenden. Ist dieses geschehen, dann liegt eine Sturzgeburt nicht vor.

Der Geburtsvorgang muß sich anders abgespielt haben, als die Beschuldigte behauptet. Die Entstehung der tödlichen Verletzungen muß anders erklärt werden.

Die Untersuchung ob eine Schädelfraktur infolge einer Sturzgeburt, oder durch eine gewalttätige Verletzung entstanden ist, kann große Schwierigkeiten bereiten. Man wird namentlich deren Sitz, Ausdehnung und Form berücksichtigen, ferner die Haltung der Gebärenden, dann den Umstand des Falles und den Ort.

Die durch den Sturz des Kindes aus der Höhe der mütterlichen Genitalien entstehenden Frakturen, betreffen vorzugsweise die Scheitelbeine und zwar ebenso häufig nur eins wie auch beide. Keineswegs beweisen nach *Stumpf* Knochen sprünge, die sich über eine Naht erstrecken, eine absichtlich herbeigeführte Gewalteinwirkung. Die Fraktur bei Sturzgeburten beginnt meistens im Verlauf einer Naht und zieht auf die Suturen ungefähr senkrecht stehend nach der Mitte des Knochens zu. Meist ist der Knochen nicht in zwei Stücke völlig zerbrochen, sondern es besteht nur eine Fissur. Findet sich eine Fissur in einem Scheitelbein, in dem der Spalt parallel mit oder zwischen den Ossifikationsstrahlen verläuft und vor dem Tuber parietale endet, so ist nach *Fritsch* mit Sicherheit auf eine Sturzgeburt zu schließen. Manchmal findet man auch eine winklige Fissur, im andern Fall eine zackige Fraktur. Ausnahmsweise sieht man eine Verletzung an einem Stirn- oder Hinterhauptbein.

Leffler berichtet von einer Sturzgeburt aus ein Meter Höhe. Im Augenblick, wo die Schwangere vom Bette abspringen wollte, sei das Kind herausgefallen und habe auf dem Boden zwischen den Beinen der Mutter gelegen. Die Nabelschnur sei dabei zerrissen. Etwa eine Stunde nach der Geburt sei die Hebamme erschienen, die das Kind noch schwach atmend auf der Diele vorfand. Kurze Zeit darauf sei das Kind verchieden. Die Sektion ergab, daß das Kind geatmet und tödliche Kopf- und Rumpfverletzungen erlitten habe.

Schädelfrakturen, besonders aber tödliche Verletzungen durch Sturzgeburten aus Genitalhöhe, sind wirklich eine Seltenheit. Im allgemeinen wird man annehmen können, daß mehrfache Verletzungen der Kopfhaut, mehrfache Schädelbrüche oder Fissuren mehr für einen gewalttamen Eingriff seitens der Mutter sprechen.

Geschah der Sturz aus bedeutender Höhe auf harten Boden, oder in den Abort hinein, oder besteht die Möglichkeit, daß der Kopf mehrfach aufschlug, so wird man selbst ausgedehnte Frakturen auf die Sturzgeburt beziehen dürfen. Selbst bei hochgradigen Verletzungen müssen Neugeborene nicht sofort sterben, sie können vielmehr einige Zeit leben. Deshalb darf der Luftgehalt der Lungen nicht etwa als Beweis angeführt werden, daß die tödliche Kopfverletzung nicht sofort bei der Sturzgeburt, sondern erst später entstanden ist.

Der häufigste Tod bei Sturzgeburten in den Abort ist der des Ertrinkens. Fällt ein Kind direkt in ein mit Wasser gefülltes Gefäß oder eine Kloake, so findet man gewöhnlich keine Spur einer Verletzung. Oft sind dann in der Luftröhre, sowie in der Speiseröhre, Magen oder oberen Teil des Dünndarms die aus dem umgebenden Medium, Fäkalien oder Spülflüssigkeit, aspirierten Massen. Bei fester Beschaffenheit des Grubeninhalts kann das Kind überhaupt längere Zeit auf demselben liegen bleiben und der Körper erst langsam unter sinken.

Das zeigt folgender Fall.

Die Ch. P. gibt an, daß sie im siebten oder achten Monat schwanger gewesen sei. Eines Abends hätten die Wehen begonnen, die am folgenden Morgen schlimmer wurden. Später sei sie auf den Abort gegangen und habe verspürt, daß die Frucht abgegangen und nach unten in die Grube gefallen sei. Ob es gelebt habe, könne sie nicht sagen. Irgendwelche Laute habe sie nicht gehört. Dann habe

sie sich halb ohnmächtig in die Wohnung geschleppt und zu Bett gelegt. Infolge des elenden Gefundheitszustandes habe sie keinen vernünftigen Gedanken fassen können. Infolgedessen sei ihr auch nicht der Gedanke gekommen, daß das Kind gelebt haben könne und in dem Abort zugrunde gehen könne. Die Nachgeburt sei nach einigen Stunden abgegangen.

Der Bruder sagt aus: Infolge des Regens war in die Abortgrube Wasser hineingelaufen. Deshalb habe ich Stroh auf die Jauche gelegt, um zu verhindern, daß das Wasser bei der Benutzung des Aborts spritze.

Ein Oberlandjäger hat die Kindesleiche aus dem Abort geholt. Es sei möglich, sagt er, daß dabei trotz aller Vorsicht die verwendete Mistgabel Verletzungen am Körper veranlaßte. In der Mitte der Grube habe sich eine feste Masse befunden.

Die Leichenöffnung hat ergeben, daß es sich um ein lebensfähiges Kind handelt. Lungen, Magen und der ganze Dünndarm waren vollständig mit Luft gefüllt. Die vorgefundenen Verletzungen im Gesicht sind dem ganzen Befunde nach erst nach dem Tode erfolgt und mit größter Wahrscheinlichkeit mittels einer Mistgabel entstanden. Die mikroskopische Untersuchung der Lungen hat ergeben, daß eine Flüssigkeit darin war, wie sie sich in ländlichen Aborten vorzufinden pflegt.

Diese Feststellungen lassen sich mit den Angaben der Frau, daß sie das Kind plötzlich in den Abort hineingeboren habe, in Einklang bringen. Der Hergang ist durchaus möglich, da der an der Kindesleiche noch vorhandene Nabelschnurrest deutlich ausgefranst, die Nabelschnur also gerissen war. Unterstellt man, daß das Neugeborene zunächst auf die feste Masse in der Abortgrube auffiel und erst allmählich in die umgebende Jauche hineingeriet, so erklärt sich hieraus die nach allen anatomischen Befunden sichergestellte längere Lebensdauer und Erstickung.

Was die Haltung der Gebärenden bei Sturzgeburten anbelangt, so stimmen fast alle Autoren darin überein, daß Sturzgeburten am häufigsten im Gehen und Stehen vorkommen. Den zweitgrößten Prozentsatz ergeben die Geburten in sitzender Stellung. Bei v. Winkel und Moser stellen sie das größte Kontingent und ebenso in der gerichtlichen Medizin, dort deshalb, weil die Schwangeren in Verkennung der ganzen Geburtsumstände, oder in ver-

brecherischer Absicht häufig einen Abort auffuchen. Schwarz-schild fand im Stehen und Gehen 32, im Sitzen 11, im Hocken und Knien 3 Sturzgeburten. Schwarz-schild berichtet über ein beweisendes Beispiel einer Sturzgeburt im Stehen, da sie im Kreißzimmer beobachtet wurde. Die Schwangere habe seit zwei Stunden schwache Wehen verspürt und während sie im Saal umherging, sei das Kind, 51 cm lang, 3800 g Gewicht, plötzlich zu Boden gefallen.

Es wird über Fälle berichtet, in denen die Sturzgeburt in der Eisenbahn, auf dem Abort, in Droschken, beim Aussteigen aus dem Wagen oder dem Bett, auf einer Treppe usw. erfolgte. Kurzum, sie ist überall an jedem Ort möglich. Schwarz-schild hat eine Zusammenstellung seiner Sturzgeburten angegeben. Auf der Straße 16mal, im Hausflur 4mal, im Wagen 12mal, beim Aussteigen aus dem Wagen 1mal, in der eigenen Wohnung 5mal, auf der Treppe 6mal. Auf dem Abort außerhalb der Anstalt 4mal, innerhalb 4mal. Auf dem Nachttopf 1mal. Im Schwangerensaal 3mal, im Vorbereitungsraum 2mal, im Kreißsaal 6mal. Unmittelbar vor oder nach dem Betreten des Kreißsaales 13mal.

Wir hatten folgenden Fall von Sturzgeburt auf der Straße zu untersuchen:

Die Beschuldigte J. B., 2. Gebärende sagt folgendes: Morgens um 6 Uhr habe sie Leibschmerzen verspürt. Sie wollte in die Hebammenlehranstalt. Schon in ihrem Hause habe sie sich die Beinkleider ausgezogen. Auf der Straße habe sie ungefähr um 7 Uhr das Kind plötzlich verloren. Es war noch dunkel. Sie habe das Kind aufgehoben und in die Beinkleider gewickelt. Dann wollte sie zur Klinik. Da es sehr kalt war und sie viel Blut verloren habe, sei sie in ein Haus gegangen, um sich auf die Stufen zu setzen. Später habe sie sich in den Keller begeben und sich dort an die Wand gelehnt. Dann nahm sie das Kind unter ihren Mantel und ging vor das Haus. Da ihr schwarz vor den Augen wurde, ging sie wieder in den Keller. Sie will nichts mit dem Kinde gemacht haben. Ob sie es nochmals verloren hat, weiß sie nicht.

Als eine Zeugin zufällig in den Keller kommt, wehrt sich die Beschuldigte heftig und versucht auszureißen. Sie will ihren Namen nicht nennen und leugnet ein Paket zu haben. Das Neugeborene wurde im Keller in einem Paket gefunden. Es war in Beinkleider eingewickelt, die am Hals ziemlich fest verknüpft waren. Auf dem

Paket lagen 3—4 ca. handgroße Steine. Das Neugeborene wurde, da Todgeburt festgestellt wurde, in die Anatomie eingeliefert. Dort wurde aber noch Leben bemerkt und das Kind zur Frauenklinik überwiesen. Es hat dort noch einige Male gewimmert und ist dann verstorben.

Die gerichtlich ausgeführte Obduktion ergab eine vollkommene Zertrümmerung des linken Scheitelbeines. Im rechten Scheitelbein befand sich ein feiner Sprung, ebenfalls an der Schädelbasis in beiden vorderen Schädelhöhlen. Die Kopfdecken waren blutig durchtränkt. Die linke Lunge schwamm vollkommen. Im Magen und Darm befand sich Luft. Die Möglichkeit einer Sturzgeburt kann nicht widerlegt werden. Der Tod ist erfolgt durch zahlreiche Schädelbrüche, die durch stumpfe Gewalt hervorgerufen sind. Gewalttames Aufschlagen ist geeignet sie ebenso zu erzeugen wie Schlag mit dem Knüppel. Die Annahme, daß diese Verletzungen infolge einer Sturzgeburt hervorgerufen sind, lehnen wir ab.

Im allgemeinen ist der Verlauf der Sturzgeburten bei Schwangeren, die heimlich gebären wollen so, daß sie im letzten Augenblick dennoch Hilfe suchen, einerseits aus Angst, andererseits aus Schmerzen durch die Geburt. So kommt eben die Niederkunft überall vor.

Eine besondere Bedeutung in der Gerichtsmedizin zur Entscheidung der Frage ob eine Sturzgeburt vorliegt oder nicht, kommt der Prüfung der lokalen Verhältnisse zu. Die Erhebung kommt namentlich bei angeblichen Abortgeburten oder in fahrenden Eisenbahnzügen usw. in Frage. Sturzgeburten in fahrenden Zügen sind sehr selten, haben aber um so größeres Interesse vom gerichtlich-medizinischen Gesichtspunkt aus betrachtet.

Bemerkenswert ist ein eigenartiger von Lehn mitgeteilter Fall. Es handelt sich um eine 26jährige II.-Gebärende, die nach kurzer Wehendauer während der Eisenbahnfahrt zur Klinik plötzlich starken Stuhl drang verspürte. Die Geburt trat auf dem Klosett des fahrenden Eisenbahnzuges von der Frau unbemerkt ein. Patientin traf eine halbe Stunde später mit ungelöster Placenta in der Klinik ein. Das Kind wurde $4\frac{1}{2}$ Stunden später eingeliefert. Es war auf der Bahnstrecke gefunden worden. Es befand sich in lebensfrischem Zustand, blutete nicht und zeigte nur geringe Hautabschürfungen. Länge 47 cm, Gewicht 2860 g.

Für die Feststellung, ob eine Sturzgeburt in die Abortgrube erfolgte, ist die Beschaffenheit der ganzen Anlage von Wichtigkeit. Weiterhin ist die Weite und Höhe des Trichters und die Sitzöffnung von Bedeutung. Ist die Konstruktion des Abortes derartig, daß kein enger Trichter das Durchfallen des Kindes hindert, nachdem einmal die Sitzöffnung passiert ist, so sind die Verhältnisse für ein Abstürzen des Kindes in die Grube äußerst günstig. Ergibt sich aber aus der Abortkonstruktion, daß ein einfaches Durchfallen des Kindes schlecht möglich ist und zeigen sich am Kindeskörper etwa Kratzer, Druckspuren, horizontale Schädelbrüche, oder eine Klavikularfraktur, so ist das Neugeborene mit Gewalt hineingepreßt worden. Zur Entscheidung ob im speziellen Fall die Sturzgeburt mit Hindurchfallen des Kindes möglich war, bleibt immer der Vergleich der Abortmaße mit der Kopfgröße des Kindes und dessen Schulterbreite.

Andererseits kommt es vor, daß eine Sturzgeburt auf dem Abort behauptet wird und die Besichtigung zeigt, daß die Aussage unrichtig ist. Wenn sich dort keine Blutspuren zeigen, und es unmöglich ist, daß sie weggeputzt sind, und aus den Verunreinigungen mit Blut und Meconium sich ergibt, daß die Geburt an anderer Stelle vor sich ging, so kann man die Angabe vieler Angeklagten als Lüge zurückweisen. Besonders der Nachweis von Meconium im Bett oder auf anderen Gegenständen beweist, daß die Geburt dort stattgefunden haben muß und nicht an anderer Stelle.

Unter den Befunden am Kinde ist weiterhin auf das Verhalten der Nabelschnur zu achten.

Stürzt das Kind aus den Genitalien der Mutter heraus, so kann sie entweder zerreißen, oder bleibt ganz, indem sie die Placenta von der Wand des Uterus ablöst. Daß die Placenta bei Sturzgeburten zugleich mit dem Kinde herausgerissen wurde, ist wiederholt beschrieben worden und spricht in hohem Maße für eine Sturzgeburt, ohne sie aber zu beweisen. Schließlich kann die Nabelschnur noch intakt bleiben, ohne daß die Nachgeburt sofort nachfolgt, was immerhin bei Sturzgeburten im Sitzen und Knien eintreten kann.

Was zunächst die Häufigkeit der Nabelschnurzerreißen anbelangt, so fanden Klein 47,2%, Hellhake und Winkler 27,9% unter ihren Sturzgeburten.

Späht und Schatz haben gefunden, daß die Nabelschnur bei allmählicher Belastung im Mittel ein höheres Gewicht zu ertragen vermag als das eines Neugeborenen.

Beim Herausstürzen des Kindes wird es wohl kaum zu einer allmählichen Dehnung der Nabelschnur kommen, falls nicht besondere Umstände den Kindessturz hemmen, sondern zu einem plötzlichen Ruck, der teils durch die Schwerkraft des Kindes und der Fallgeschwindigkeit, teils durch die Kraft, mit der das Kind ausgetrieben wird, bedingt ist. Daß ein Zerreißen leichter bei ungewöhnlich dünner oder krankhaft veränderter Nabelschnur eintritt, ist verständlich.

Aus den Versuchen von Pfannkuch und Hofmann geht hervor, daß nicht einmal das Gewicht eines reifen Kindes zur Zerreißen der Nabelschnur notwendig ist. Sie haben gezeigt, daß bei einer Fallhöhe gleich der Länge der Nabelschnur schon 500—750 g und bei einer Fallhöhe von der halben Höhe der Nabelschnur 710 bis 1000 g genügten, um die Nabelschnur zu zerreißen. Daher folgert Pfannkuch, daß in allen Fällen von Geburten, bei denen das volle Gewicht des herausstürzenden Kindes auf die Nabelschnur wirken könne, nicht nur die größte Wahrscheinlichkeit, sondern die fast unbedingte Gewißheit des Zerreißen der Nabelschnur gegeben sei.

Wenn die Mutter über einer niedrigen Abortschale oder in einen Eimer hineingebeiert, wird die Nabelschnur möglicherweise gar nicht gespannt. Straßmann führt einen Fall von einer 19jährigen an, die, während sie auf dem Eimer saß, plötzlich das Kind verlor. Die 30 cm lange Nabelschnur war fetzig durchtrennt und die Lungen größtenteils luftleer.

Umgekehrt beobachteten v. Winkel 2mal, Reinhard 1mal, daß das Kind frei an der Nabelschnur hing.

Wir hatten folgenden Fall. Die M. S. hat in der Nacht gegen 3 Uhr ein Kind geboren. Sie verspürte Stuhldrang, ging aufs Klosett und gebar hier plötzlich ein Kind. Von dem Geburtsbeginn hatte sie vorher nichts gemerkt. Das Kind fiel in den Trichter. Die Frau blieb auf dem Sitzbrett sitzen, bis die Nachgeburt ausgestoßen war.

Das Gewicht des 51 cm großen Kindes beträgt 3540 g. Der Mutterkuchen mit einer 68 cm langen Nabelschnur ist intakt. Das

freie Ende des Stranges ist unregelmäßig gerissen. Am kindlichen Körper befindet sich ein 12 cm langer Nabelschnurrest, dessen freies Ende ebenfalls unregelmäßig gerissen ist. Lungen und Magen schwimmen im Wasser.

Die Zerreißung der Nabelschnur hängt in erster Linie von der Stellung der Kreißenden ab. v. Winkel fand unter 42 Zerreißungen bei Sturzgeburten 32 stehend und 10 sitzend. Bei Hellhake erfolgte die Zerreißung 14mal im Stehen und 2mal im Sitzen. Daraus ergibt sich, daß die Nabelschnur am häufigsten im Stehen zerreißt.

Die Versuche von Pfannkuchen und Hofmann lehren, daß das Gewicht des Kindes untergeordnete Bedeutung, während die Länge der Nabelschnur Einfluß auf die Häufigkeit der Zerreißung hat.

Über eine außergewöhnliche Länge der Nabelschnur berichtet Moser von einer 23jährigen I.p. Sie gebär auf dem Wege zur Klinik im Stehen, so daß das Kind auf die Straße stürzte. Die 79 cm lange Nabelschnur riß nicht entzwei.

Selbst bei Sturzgeburten im Stehen reißt nicht immer der Nabelstrang. Entweder können die Kleider die Wucht des Falles abschwächen, oder es kann die Ursache in der größeren Widerstandsfähigkeit der betreffenden Nabelschnur liegen. Dicke der Schnur, Varicositäten und Aneurysmen werden als zur Zerreißung disponierende Momente angegeben.

Der Sitz der Ruptur ist auch von Wichtigkeit. Nach Ansicht von v. Winkel befindet sich die auffallende Prädilektionsstelle für Zerreißungen innerhalb des kindlichen Drittels, auch und vielleicht vorwiegend deshalb, weil das diejenige Stelle der Schnur ist, die weder von Weichteilen, wie Vagina und Uterus umfaßt ist, noch von solchen, wie am Abdomen bis zu den Genitalien des Kindes hin, anliegt. Derselben Auffassung sind Pfannkuch, Straßmann und Unger. Nach Fritsch liegt der Riß bei Sturzgeburten meist in der dem Kinde benachbarten Hälfte.

Im letzten von uns berichteten Fall hatten wir eine 80 cm lange Nabelschnur. Die Rißstelle lag 12 cm vom kindlichen Körper entfernt; also ebenfalls im foetalen Drittel.

Schwarzchild hat eine Tabelle zusammengestellt, die die Ergebnisse mehrerer Autoren bewertet. Danach ergibt sich, daß die

Rißstellen in 73,8% im foetalen Drittel der Nabelschnur liegen.

Daß zur Zerreißung der Nabelschnur keine besondere Kraft nötig ist, erkennt man daran, daß heimlich gebärende Frauen dieselbe bisweilen mit den Händen zerreißen.

Die Entscheidung, ob die Nabelschnur durch Sturz zerrissen oder nachträglich durchschnitten wurde, läßt sich aus der Beschaffenheit der peripheren Enden leicht erkennen. Eine mit einem scharfen Instrument durchtrennte Nabelschnur wird stets eine glatte, gerade, wenn auch nicht immer quere Schnittfläche aufweisen, in der sämtliche Teile der Nabelschnur fast in einer Ebene liegen, besonders dann, wenn der Strang in einem Zuge durchschnitten wurde. Bei der Zerreißung durch Sturzgeburt dagegen sind die Enden fransig, uneben und meist in einen Lappen oder mehrere spitze Zipfel auslaufend. Bisweilen ist der Unterschied nicht sehr deutlich, weil einerseits ein stumpfes Messer oder eine schlechte Schere viele und unregelmäßige Zacken in der Schnittfläche hervorbringt und andererseits beim Reißen der Nabelschnur die Trennungsfläche bisweilen glatt und eben sein kann. *Huber* hat auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die Nabelschnur zuerst angechnitten und dann durchrissen wird.

Im allgemeinen und zusammenfassend kann man sagen, daß eine zerfchnittene Nabelschnur nicht für Kindessturz spricht, während umgekehrt der zerrissene Strang die Annahme der Sturzgeburt möglich erscheinen läßt, ohne sie zu beweisen.

Eine Entscheidung darüber, ob eine Nabelschnur durch Sturz oder absichtlich zerrissen ist, ist nicht möglich. Bei absichtlicher Zerreißung liegt nach *Unger* die Rißstelle mehr gegen die Mitte des Nabelstranges zu, nach *Haberd* irgendwo im Verlauf des Stranges, zuweilen auch nahe dem Kinde, keineswegs mehr nach der Mitte zu.

Sehr selten sind mehrfache Risse der Nabelschnur. *Koch* sah in einem Falle von Sturzgeburt, daß die 50 cm lange Nabelschnur 25 cm vom Nabel entfernt durchrissen war und am foetalen Teil noch drei Verletzungen aufwies, von denen zwei nur die Amnion-scheide betrafen, während die dritte etwa die halbe Dicke der Schnur einnahm und eine Arterie und die Vene durchtrennte. Auch *v. Winkel* beobachtete mehrfache Zerreißungen, ebenso *Schwarzchild*. *Leffer* beschreibt einen Fall von Sturzgeburt im Stehen, wobei der an dem Kindeskörper haftende Teil

der Nabelschnur zwei Zerreißen darbot. In etwa 6 cm Entfernung oberhalb des 14 cm langen Nabelschnurrestes fand sich ein zweiter, aber unvollständiger etwas suffundierter Riß mit weiter Eröffnung der Vene. Etwa 12 cm oberhalb des placentaren Restes faß ebenfalls ein partieller Riß.

Man könnte annehmen, daß bei einer Nabelschnurzerreißen, falls sie nicht sofort unterbunden wird, das Kind leicht verblutet. Die Gefahr der Verblutung ist aber äußerst selten, wenn die Nabelschnur bei Sturzgeburten zerreißen oder nachträglich durchtrennt, wenn sie auch fast niemals unterbunden wird. Eine Verblutung kann um so leichter eintreten, je näher die Nabelschnur am Nabelring abgetrennt wird. Winkel führt drei Fälle von Verblutung nach Sturzgeburten aus dem zerrissenen Strang an und zeigt hierbei, daß die Blutung um so stärker war, je näher die Rißstelle am Nabel lag. Daß die Gefahr der Verblutung aus der zerrissenen Nabelschnur eine so geringe ist, hat seine Ursache darin, daß der Blutdruck in der Bauchorta mit dem Einschalten des Lungenkreislaufes bei dem ersten Atemzuge wenigstens vorübergehend sinkt; zum andern, daß sich die Nabelarterien lebhaft kontrahieren, wobei ebenfalls der spiralige Verlauf der Nabelschnur günstig auf den Stillstand der Blutung wirkt.

Zur Begutachtung der Frage, ob eine Sturzgeburt anzunehmen ist oder nicht, kann das Verhalten der Lungenprobe und der Magen- und Darmprobe von Wichtigkeit sein. Handelt es sich um einen Kindessturz in einen Abort oder in einen mit Flüssigkeit gefüllten Eimer hinein, so kann das Fehlen der Luftatmung die Möglichkeit der Sturzgeburt unterstützen. Die positiven Befunde sind mit Vorsicht zu bewerten, da oft schon ein Atemzug des Kindes genügt, um die Lungen teilweise mit Luft zu füllen. Bei einer Sturzgeburt, wobei der Tod des Kindes durch Verletzungen beim Auffallen auf harten Boden entstanden ist, spricht die luftleere Beschaffenheit der Lungen und des Magendarmtraktes zugunsten derselben. Umgekehrt kann aus dem Nachweis der stattgefundenen Atmung nicht einfach eine Sturzgeburt abgelehnt werden, da Neugeborene selbst nach schwersten Verletzungen lange leben können und mithin geatmet haben.

Zusammenfassung.

Auf Grund der Fälle des Instituts, die dieser Arbeit zugrunde liegen und der Angaben, die wir in der Literatur vorfanden, können wir zusammenfassend sagen, daß die Entscheidung der Frage, ob eine Sturzgeburt vorliegt, oft recht schwierig ist, zumal die des Kindesmordes Angeklagten oder Verdächtigen nicht selten eine Sturzgeburt vorzutäuschen suchen. Stehen die Untersuchungen an der Mutter und ihre Aussagen, die besonderen Umstände des Falles und die Untersuchung oder Obduktion des Kindes mit dem wirklichen Sachverhalt, den tatsächlichen Ermittlungen und den örtlichen Untersuchungen im Einklang, so kann eine Sturzgeburt zugegeben werden. Häufig muß sich der Gerichtsarzt beschränkend äußern, daß der Befund an der Kindesleiche keinen Gegenbeweis gegen die Aussagen der Mutter, daß die Geburt des Kindes in der von ihr angegebenen Weise erfolgt ist, geliefert hat. Eine Sturzgeburt im Sinne der gerichtlichen Medizin kann nur als möglich zugegeben bzw. als unmöglich ausgeschlossen, aber niemals exakt bewiesen werden.

Zum Schluß meiner Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Pietrusky herzlich für die Überlassung des Themas, sowie Herrn Reg.-Med.-Rat a. D. Dr. Esser für die vielfache Unterstützung und seinen Rat bei Aufassung der Arbeit zu danken.

Literatur.

1. B ö h m e r : Zeitschrift f. d. gerichtl. Medizin. 1928 Bd 12 S. 5.
2. C a s p e r : Handbuch d. gerichtl. Medizin. Bd II, Berlin 1871.
3. C o r i n : Zeitschrift f. Medizinalbeamte. 1893, S. 249.
4. D e y : Die präcipitierten Geburten der Marburger Entbindungsanstalt. Marburg 1903.
5. D ö r f l e r : Friedrichs Blätter f. gerichtl. Medizin. 1893. S. 269.
6. E m m e r t : Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Leipzig 1900.
7. F o g : Zeitschrift f. gerichtl. Medizin. 1924. Bd. 4. S. 276.
8. F r a n k e : Über Sturzgeburt und ihre forense Bedeutung. Berlin 1909.
9. F r e y e r : Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1886. Bd. 44. S. 284.
10. F r i t s c h : Gerichtsärztliche Geburtshilfe. Stuttgart 1901.
11. G o t t s c h a l k : Gerichtliche Medizin. Leipzig 1909.
12. G u d e - S t o l p e r : Gerichtliche Medizin. Leipzig 1900.

13. Haberda: In Beiträgen zur gerichtl. Medizin. Zur Lehre vom Kindesmord, Bd. I, Leipzig, 1911.
14. Haberda: In Schmidtman: Handbuch der ger. Medizin. Bd. I. Berlin 1905.
15. Haberda: Die foetalen Kreislaufwege des Neugeborenen. Wien 1896.
16. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Berlin 1927.
17. Kaufmann: Die klinische Bedeutung der Sturzgeburt. Freiburg 1907.
18. Klusmann: Ein Fall von Sturzgeburt im Akte vermeinter Stuhlentleerung. Göttingen 1909.
19. Knepper: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1899. Bd. 18. S. 279.
20. Kob: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1902 Bd. 24. S. 67.
21. Kornfeld: Friedreichs Blätter f. gerichtl. Medizin. 1888. S. 64.
22. Kratter: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Bd. I. Stuttgart 1912.
23. Lehn: Münchener med. Wochenschrift 1916. S. 1458.
24. Leffer: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin 1917. Bd. 54. S. 44 und 51.
25. Lipinski: Zur Klinik und Prognose der Sturzgeburten. Breslau 1912.
26. Moser: Die Sturzgeburten in der Münchener Frauenklinik in den Jahren 1892 und 1893 und das Verhalten ihres Wochenbettes. München. 1895.
27. Placzek: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1903. Bd. 26. S. 42.
28. Puppe: Atlas und Grundriß der gerichtl. Medizin. Bd. II. München. 1908.
29. v. Scanzoni: Münchner Medizinische Wochenschrift. 1902. S. 1102.
30. Schwarzfild: Über praecipitierte Geburten und ihre Folgen. München 1903.
31. Schwarzfild: Zentralblatt f. Gynäkologie 1904. S. 369.
32. Skrzeczka: in Maschka: Handbuch der gerichtl. Medizin Bd. I. Tübingen 1881.
33. Sporleder: Über Sturzgeburten. Breslau 1916.
34. Straßmann: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1911. Bd. 42. S. 219.
35. Straßmann: Lehrbuch d. gerichtl. Medizin. Stuttgart 1931.
36. Straßmann: Deutsche med. Wochenschrift. 1890, Nr. 44.
37. Straßmann: Zeitschrift für Medizinalbeamte. 1911. S. 757.
38. Teufel: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1896. Bd. 11. S. 146.

39. U n g e r : in Schmidtman's Handbuch der gerichtlichen Medizin. Band II. Berlin 1907.
40. v. W i n k e l : Lehrbuch der Geburtshilfe.
41. v. W i n k e l : Über die Bedeutung präcipitierter Geburten für die Ätiologie des Puerperalfiebers. München. 1884.
42. v. W i n k e l : Handbuch der Geburtshilfe.
43. W i n k l e r : Über präcipitierte Geburten und ihre Folgen. Breslau. 1904.
44. W i t t h a u e r : Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin. 1901. Bd. 22. S. 392.

Lebenslauf.

Am 12. März 1911 wurde ich als Sohn des Kaufmanns Edmund Lehnhardt und seiner Ehefrau Maria geb. Ohly zu Essen-Kray geboren. Mit sechs Jahren trat ich in die Schule ein. Dann besuchte ich das Reform-Realgymnasium zu Duisburg-Hamborn, wo ich im Jahre 1931 die Reifeprüfung bestand. Ich studierte an den Universitäten in Marburg, Köln und Heidelberg. Dort bestand ich 1933 das Physikum. Meine klinischen Semester verbrachte ich in München und Bonn.